



Gramin Krishi Mausam Sewa
 India Meteorological Department
 Kerala Agricultural University
 Vellanikkara, Thrissur, Kerala



Agromet Advisory Bulletin

Date : 16-06-2020

Weather Forecast of PALAKKAD(Kerala) Issued On : 2020-06-16(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-06-17	8.0	32.0	24.0	90	85	8.0	270	6
2020-06-18	6.0	32.0	24.0	90	85	8.0	270	6
2020-06-19	1.0	32.0	24.0	90	85	6.0	270	2
2020-06-20	0.3	32.0	24.0	90	85	8.0	270	2
2020-06-21	20.0	32.0	24.0	90	85	8.0	250	8

Weather Summary/Alert:

- Comparatively low rainfall is expected in the district for coming days.
- ജില്ലയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ താരതമ്യേന നേരിയ തോതിലുള്ള മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.

General Advisory:

- To avoid the chances of rotting of roots in vegetables, banana etc., plant them in raised beds with proper water channels. Use pest and disease resistant varieties for planting.
- പച്ചക്കറികൾ, വാഴ എന്നിവ നടുമ്പോൾ മണ്ണ് കൂട്ടി പൊക്കിയതിനു ശേഷം കൃത്യമായ ചാലുകൾ ഉണ്ടാക്കി നടുന്നത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വേർ ചീയൽ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തടയാൻ ആകും. കീട-രോഗ പ്രതിരോധശേഷി കൂടിയ വിത്തിനങ്ങൾ നടാനായി ഉപയോഗിക്കുക.

SMS Advisory:

-

-

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
TOMATO	<ul style="list-style-type: none"> • A mixture of Trichoderma enriched organic fertilizer along with bone meal, neem cake etc. at 50kg per cent can be applied as basal dose for vegetable cultivation. It is better to spray the vegetables with bio fertilizers like Azospirillum, VAM etc. at weekly intervals. • പച്ചക്കറികളിൽ ട്രൈക്കോഡെർമ സമ്പുഷ്ടമായ ജൈവവളത്തോടൊപ്പം എല്ലുപൊടി, വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് എന്നിവ ചേർത്ത മിശ്രിതം ഒരു സെന്റിന് 50 കിലോഗ്രാം എന്ന തോതിൽ അടിവളമായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ജീവാണു വളങ്ങളായ അസോസ്പൈറിലം, വാം എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാഴ്ച ഇടവിട്ട് പച്ചക്കറികളിൽ തളിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഉചിതം.

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
CUCUMBER	<ul style="list-style-type: none"> To avoid the disease infection of fruits, take proper measures like spreading of coconut leaves etc. in the soil if the plant is at flowering stage. വള്ളി വീശിയ വെള്ളരി വർഗ്ഗ വിളകളിൽ കാഴ്ചക്കുണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള രോഗബാധ തടയുന്നതിനായി മണ്ണിൽ തെങ്ങോലകൾ വിരിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക.

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
BANANA	<ul style="list-style-type: none"> There is a chance of leaf spot disease in banana. As a prophylactic measure spray 20g/L pseudomonas by covering the whole plant. വാഴയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇലപ്പുള്ളി രോഗത്തിന് എതിരായി 20 ഗ്രാം സ്യൂഡോമൊണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ വാഴ മൊത്തമായി തളിച്ച് കൊടുക്കുക. മഴയില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ വേണം ഇത് തളിച്ച് കൊടുക്കാൻ.

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
COW	<ul style="list-style-type: none"> Deworming of animals should be done only after dung sample examination. In calves first dose of medicine should be given within 15 days of age. (CAADECCS, KVASU, Mannuthy) കന്നുകാലികൾക്ക് ചാണക പരിശോധന നടത്തി വിരയുണ്ടാകാൻ ഉറപ്പാക്കിയതിനു ശേഷം വിര മരുന്നുകൾ നൽകുക. കന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യധോസ് പ്രസവിച്ചു രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നൽകണം.(CAADECCS , KVASU മണ്ണൂർ)